


ຜົນຂອງການສຳຮວດ ແລະການວິຈັຍທາງດ້ານສະຕິຕິ
ກ່ຽວກັບການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ແລະນຳໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມິດອື່ນ
ຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວໃນຕົວເມືອງມິນິອາໂປລິສ

ATOD



The Results of Statistic Survey
On Alcohol, Tobacco and Other Drug (ATOD)
Use in Lao Community-Minneapolis

ATOD Program
2005-2006

ອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖ
Lao Advancement Organization of America

Lao Cultural Center Building, 2648 West Broadway Avenue, Minneapolis, MN 55411
Tel: 612.302.9048 | Fax: 612.522.2431 | E-mail: laoamerica@laoamerica.org | www.laoamerica.org

**ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຮວດ ແລະການວິຈັຍທາງດ້ານສະຖິຕິ
ກ່ຽວກັບການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ແລະການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມິດອື່ນ
ພາຍໃນປະຊາຄົມລາວ ທີ່ເມືອງມີນີອາໂບລິສ ປີ 2005-2006**

ໂດຮ໌ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜແນກປ້ອງກັນເຊື້ອສານເຄມີມິຟິດ, ກະຊວງສັງຄົມສົງເຄາະແຫ່ງຣັຖມີນີໂຊຕາ, ອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສໍາຮວດ ແລະວິຈັຍທາງດ້ານສະຖິຕິຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການດື່ມເຫຼົ້າ, ການສູບຢາ ແລະການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມິດອື່ນໆພາຍໃນປະຊາຄົມລາວທີ່ເມືອງມີນີອາໂບລິສ. ຈາກຕົວຢ່າງປະຕິບັດການ 131 ຄົນ ໃນປີ 2005 (ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການຂອງສະມາຊິກ) ແລະ 149 ຄົນ ໃນປີ 2006 (ລຸນຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະມາຊິກກັບໂຄງການ) ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງທັງໝົດສ່ວນຫຼວງຫຼາຍເປັນຊາວເມືອງ ມີນີອາໂບລິສ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນແອອັດ ແລະຍັງໄດ້ອາໄສຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຕ່າງໆຈາກຣັຖບານ. ຊຸມຊົນຊາວລາວ ເກີນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາຄົມ ໄດ້ໃຫ້ການຕິດພັນກັບການຝຶກອົບຮົມນໍາໂຄງການຕ້ານຢາເສບຕິດມິຟິດ ທີ່ອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເດືອນກໍຣະກະດາ ຫາເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2004 ຜ່ານມານີ້ ດ້ວຍດັສນີແຫ່ງການພົວພັນ ($r=+.225^{***}$) ທີ່ຍືນຍັນໄດ້ຮອດ 99.9% (1), ໃນປະຈຸບັນ, ຄົນລາວຊຶ່ງກວມເຖິງ 75% (1) ຫາ 94.6% (ຕາຕະລາງ 2) ຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຮັບຮູ້ຕໍ່ການສູບຢາ, ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມິດອື່ນໆ ໄດ້ເປັນປັດຈັຍກໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຕ່າງໆ ຕໍ່ສູຂພາບຂອງຄົນລາວ. ຣະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຄິດສະເລັ່ງແຕ່ 87% (1) ເຖິງ 97.3% (ຕາຕະລາງ 1, 16) ໂດຮ໌ສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຄົນທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 12-18 ປີ ແລະ 51 ປີ ຂຶ້ນໄປທີ່ກວມເອົາ- 89.5% ແລະ 100% ຂອງຊຸມຊົນຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງ 52). ຣະດັບແຫ່ງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງວັຍອາຍຸດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງຈະກາຍເປັນແຮງດັນ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວ ກໍຄືປະຊາຄົມລາວກາຍເປັນເຂດປອດຈາກຢາເສບຕິດຕ່າງໆ (1). ນັ້ນມັນ ສອດຄ່ອງກັບເອກກະສານ (ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຮວດ ແລະການວິຈັຍ ກ່ຽວກັບ ເອ-ທີ-ໂອ-ດີ ປີ 2004-2005 ຂອງອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັຖ) ທີ່ມີເຖິງ 71% (1). ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກສໍາຮວດ ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.9% ດ້ວຍດັສນີຍືນຍັນ 95% (ຕາຕະລາງ 89, 90)). ນອກຈາກນັ້ນ 94.0% ຂອງປະຊາຄົມ ໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຕ່າງໆດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນສາຍເຫດອັນໜຶ່ງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການລ່ວງລະເມີດ ແລະເຮັດຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ . ຣະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກໍຣະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຈາກ 86.26% (ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມ ປີ 2005) ມາເປັນ 96.98% (ລຸນຫຼັງການສົ່ງສູດໂຄງການ ປີ 2006) (1)(ຕາຕະລາງ 1, 3, 91, 92). ຍ້ອນຜື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ທັງໝົດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ການປະພຶດປະຕິບັດຕົວຂອງສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງເຖິງ 63% ໃນຊ່ວງໄລຍະກ່ອນການສໍາຮວດ (2005)(1) ແລະພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ຄວາມກັງວົນດັ່ງກ່າວໄດ້ລົດລົງ 12.51% ດ້ວຍດັສນີທີ່ຍືນຍັນໄດ້ 95% (ຕາຕະລາງ 1, 4, 93, 94) . ຄົນລາວໄດ້ເວົ້າລົມ ຫຼືບອກກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດເປັນອັນຕະຣາຍ ໃຫ້ແກ່ສູຂພາບຂອງຕົນເອງ ໃນເມື່ອຫາກໄດ້ນໍາໃຊ້ເຊື້ອສານເຄມີ ມິຟິດ ດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 66.03% ເຖິງ 91.28% (ຕາຕະລາງ 1,5, 6, 95, 96, 97, 98), ໂດຮ໌ສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 12 ຫາ 18 ປີ ແລະຜູ້ເຖົ້າທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 51 ປີ ຂຶ້ນໄປ ປະມານ 70.17% ຫາ 84.26% ຕາມລໍາດັບ (ຕາຕະລາງ 61, 62, 63, 64). ການເວົ້າລົມ ກໍຄືການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຍືນຍັນໄດ້ທາງດ້ານສະຖິຕິ 95% ຈາກ 19.26% ເຖິງ 25.25% ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງຕົນ

(1) ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຮວດ ແລະການວິຈັຍທາງດ້ານສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ແລະນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມິດອື່ນ ພາຍໃນປະຊາຄົມລາວ (ການສໍາຮວດກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ ປີ 2005)

ເອງ ກໍຄືການໃຫ້ອຳນວນຕໍ່ບັນດາໝູ່ເພື່ອນ ແລະຕໍ່ສັງຄົມ ຖ້າທຽບໃສ່ອັດຕາການໂອ້ລົມກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມໄກ້ຊິດ ແລະການໃຊ້ເວລາທີ່ຕິດພັນໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ, ການໂອ້ລົມຕໍ່ສະມາຊິກທີ່ຢູ່ໃນພາຍໃນຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ຈຶ່ງມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກ່ວາ 5.99% ດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຍືນຍັນໄດ້ຮອດ 95%. (1) (ຕາຕະລາງ 1, 5, 6, 95, 96, 97, 98)

ໃນປະຈຸບັນຄົນລາວຕື່ມເຫຼົ່າ ມີພຽງແຕ່ 12% (ຕາຕະລາງ 1, 7) ຫາ, 21%(1). ຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ມີໜ້ອຍກ່ວາ 8% (1) (ຕາຕະລາງ 99, 100) . ຜູ້ຊາຍຕື່ມເຫຼົ່າຫຼາຍກ່ວາຜູ້ຍິງ 3 ເທົ່າຕົວ(1) ຫຼື 1.52 ເທົ່າຕົວ ໃນປີ 2006 (ຕາຕະລາງ 32, 33, 34). ຜູ້ທີ່ຕື່ມເຫຼົ່າຫຼາຍກ່ວາໜູ່ 50% ແມ່ນຄົນທີ່ມີອາຍຸ 19-25 ປີ (1) ແຕ່ໃນວັຍດັ່ງກ່າວ, ປີ 2006 ມີພຽງແຕ່ 3.5% (ຕາຕະລາງ 67, 68, 69) ແລະຫຼາຍກ່ວາໜູ່ ແມ່ນຈໍາພວກຄົນທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 51 ປີຂຶ້ນໄປ. ຖ້າສືບທຽບໃສ່ປີ 2005 ກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ, ການຕື່ມເຫຼົ່າ ກໍລົດລົງ ດ້ວຍ 8.08%. ອີງຕາມຕົວເລກທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການສູບຢາ ກໍມີກະແສລົດລົງ ດ້ວຍຈັ່ງຫວະດຽວກັນກັບການຕື່ມເຫຼົ່າ (ຕາຕະລາງ 1, 9, 16, 38, 39, 40, 73, 74, 75, 103, 104). ການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນປະຊາຄົມລາວ ມີພຽງແຕ່ 4.6-5.3% ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 19-25 ປີ (1).

ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວທີ່ມີການກ່ຽວພັນກັບການສູບຢາ, ການຕື່ມເຫຼົ່າ ແລະການນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມຊົນ ໄດ້ມີສາຍພົວພັນ ແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ກັນ ແລະກັນ ກັບການຝ່າຜົນຣະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ ($r=+.470^{**}$). ໃນປີ 2005 (1) ແລະໃນປີ 2006 ($r=+.689^{**}$) (ຕາຕະລາງ 88, ເສັ້ນສະແດງ 1). ການເວົ້າລົມ ຫຼືບອກກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນອັນຕະຣາຍ ໃຫ້ແກ່ສຸຂະພາບ ມີການຕິດພັນກັບ ການຕື່ມເຫຼົ່າໃນປະຈຸບັນ ($r=-.183^{*}$)(1) ແລະການເຂົ້າປະກອບສ່ວນນໍາໂຄງການຕ້ານຢາເສບຕິດມີຜິດ ທີ່ທາງອົງການລາວ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັດຈັດຂຶ້ນ ($r=+.225^{**}$) (1).

ເກີນກ່ວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາຄົມ ທີ່ຄົນລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ນໍາໂຄງການຕ້ານຢາເສບຕິດມີຜິດ ທີ່ອົງການລາວເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າໃນສະຫະຣັດໄດ້ຈັດຂຶ້ນ, ຫຼາຍກ່ວາໜູ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ ແຕ່ 12-18 ປີ ຊຶ່ງກວມຮອດເຖິງ 56% (1). ອີງຕາມການວິຈັຍແບບ Correlation ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນປັດຈັຍຜື້ນຖານ ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແກ່ສຸຂະພາບໄດ້ ($r=+.225^{**}$), ຈໍາກັດໄດ້ ບັນຫາການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ($r=+.238^{**}$), ຄວບຄຸມໄດ້ການປະພຶດຕົວຂອງສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມ ($r=+.215^{*}$), ໄດ້ມີຜື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ ເພື່ອເປັນການບອກກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກທາງດ້ານການຕ້ານຢາເສບຕິດ ($r=+.341^{**}$), ລົດຜ່ອນການຕື່ມເຫຼົ່າ ($r=-.197^{*}$) ແລະສູບຢາ ($r=-.302^{**}$) ຊຶ່ງດັ່ງກ່າວສາມາດຍືນຍັນໄດ້ຮອດ 95% ເຖິງ 99% (1).

(1) ຜົນສໍາເລັດຂອງການສໍາຮອດ ແລະການວິຈັຍທາງດ້ານສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບການຕື່ມເຫຼົ່າ, ສູບຢາ ແລະນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຊຸມຊົນ ພາຍໃນປະຊາຄົມລາວ (ການສໍາຮອດກ່ອນການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ ປີ 2005)

Table 1

	ATOD Health Problem	Breaking Laws	Worried Behavior	Using ATOD	Talking about ATOD	Drinking Alcohol Present	Drinking Alcohol Past	Smoking Tobacco Present	Drugs for Pleasure	Drugs for Pleasure Past	Participation ATOD Pgr	Your Gender	Age
N	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
Valid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missing	1,9463	1,9396	1,3758	1,9195	1,8255	1,1208	1,6846	1,1074	1,0000	1,0134	1,8389	1,6309	2,3557
Mean	.01853	.01958	.03981	.02237	.03120	.02679	.03620	.02545	.00000	.00846	.03022	.03967	.10260
Std. Error of Mean	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	2,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000
Mode	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00
Std. Deviation	.22617	.23903	.48597	.27304	.38082	.32700	.46626	.31064	.00000	.11546	.36884	.48420	1,25242
Variance	.05115	.05714	.23617	.07455	.14502	.10693	.21740	.09650	.00000	.01333	.13604	.23445	1,56857
Skewness	-4,000	-3,728	.518	-3,114	-1,733	2,351	-.802	2,562	.199	8,543	-1,863	-.548	.176
Std. Error of Skewness	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199	.199
Kurtosis	14,194	12,061	-1,755	7,804	1,016	3,574	-1,375	4,627	.395	71,945	1,490	-1,723	-1,619
Std. Error of Kurtosis	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395	.395
Minimum	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maximum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00

ATOD Health Problem

Table 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	8	5.4	5.4	5.4
Yes	141	94.6	94.6	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Breaking Laws

Table 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	9	6.0	6.0	6.0
Yes	140	94.0	94.0	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Worried Behavior

Table 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	93	62.4	62.4	62.4
Yes	56	37.6	37.6	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Using ATOD

Table 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	12	8.1	8.1	8.1
Yes	137	91.9	91.9	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Talking about ATOD

Table 6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	26	17.4	17.4	17.4
Yes	123	82.6	82.6	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Drinking Alcohol Present

Table 7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	131	87.9	87.9	87.9
Yes	18	12.1	12.1	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Drinking Alcohol Past

Table 8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	47	31.5	31.5	31.5
Yes	102	68.5	68.5	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Smoking Tobacco Present

Table 9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	133	89.3	89.3	89.3
Yes	16	10.7	10.7	100.0
Total	149	100.0	100.0	

Smoking Tobacco Past

Table 10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid No	64	43.0	43.0	43.0
Yes	85	57.0	57.0	100.0
Total	149	100.0	100.0	

ATOD Correlation Analysis

Graph 1

